

Rx

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

CEFUROVID 125

THUỐC BỘT PHA HỒN DỊCH UỐNG

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 3g chứa:

- + **Hoạt chất chính:** Cefuroxim.....125mg
(Dưới dạng cefuroxim axetil)
- + **Tá dược:** Lactose, aspartam, bột hương vị trái cây, bột talc, aerosil, natri C.M.C

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa ở đường hô hấp dưới, viêm tai giữa và viêm xoang tái phát, viêm amidan và viêm họng tái phát do vi khuẩn nhạy cảm gây ra.
- Nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng, nhiễm khuẩn da và mô mềm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin và penicillin.

LƯU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

THUỐC CHỈ BÁN THEO ĐƠN CỦA THẨY THUỐC

- Nên uống vào bữa ăn.
- **Trẻ em:**
 - Viêm họng, viêm amidan: 20mg/kg/ngày (tối đa 500mg/ ngày), chia thành 2 lần/ ngày.
 - Viêm tai giữa, chốc lở: 30mg/kg/ngày (tối đa 1g/ ngày), chia thành 2 lần/ ngày.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp:

- Tiêu hóa: tiêu chảy.
- Da: ban da dạng sần.

Ít gặp:

- Toàn thân: phản ứng phản vệ, nhiễm nấm Candida.
- Máu: tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, thử nghiệm Coombs dương tính.
- Tiêu hóa: buồn nôn, nôn.
- Da: nổi mề đay, ngứa.
- Tiết niệu – sinh dục: tăng creatinin trong huyết thanh.

Hiếm gặp:

- Toàn thân: sốt.

• Máu: thiếu máu tan máu.

• Tiêu hóa: viêm đại tràng màng giáp.

• Da: ban đỏ da hình, hội chứng Steven – Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc.

• Gan: vàng da ứ mật, tăng nhẹ AST, ALT.

• Thận: nhiễm độc thận có tăng tạm thời urê huyết, creatinin huyết, viêm thận kẽ.

• Thần kinh trung ương: co giật (nếu liều cao và suy thận), đau đầu, kích động.

• Bộ phận khác: đau khớp.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

• Với các người bệnh có tiền sử mẫn cảm với cephalosporin, penicillin, hoặc với các thuốc khác.

• Người bệnh dị ứng với kháng sinh nhóm beta – lactam.

• Kiểm tra chức năng thận ở người bệnh nặng đang dùng liều tối đa.

• Khi dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh.

• Dùng dài ngày có thể gây bội nhiễm.

• Thuốc có thể gây viêm đại tràng giả mạc. Thận trọng với người bệnh có tiền sử đường tiêu hóa, đặc biệt viêm đại tràng.

• **Phụ nữ mang thai:**

- Các nghiên cứu trên chuột nhất và chuột cổng không thấy có dấu hiệu tổn thương khả năng sinh sản hoặc có hại cho bào thai do thuốc cefuroxim.

- Sử dụng kháng sinh này để điều trị viêm thận – bể thận ở người mang thai không thấy xuất hiện các tác dụng không mong muốn ở trẻ sơ sinh sau khi tiếp xúc với thuốc tại tử cung người mẹ, cephalosporin thường được xem là an toàn sử dụng trong khi có thai.

- Tuy nhiên các công trình nghiên cứu chặt chẽ trên người mang thai còn chưa đầy đủ. Vì các nghiên cứu trên súc vật không phải luôn luôn tiên đoán được đáp ứng của người, nên chỉ dùng thuốc này trên người mang thai nếu thật cần.

• **Phụ nữ cho con bú:** Cefuroxim bài tiết trong sữa mẹ ở nồng độ thấp. Xem như nồng độ này không có tác dụng trên trẻ đang bú sữa mẹ, nhưng nên quan tâm khi thấy trẻ bị tiêu chảy, tưa và nổi ban.

TƯỢNG TÁC THUỐC:

- Giảm tác dụng: ranitidin với natri bicarbonat làm giảm sinh khả dụng của cefuroxim axetil. Nên dùng thuốc cách ít nhất 2 giờ sau thuốc kháng acid hoặc thuốc phong bế H₂, vì những thuốc này có thể làm tăng pH dạ dày.
- Tăng tác dụng: probenecid liều cao làm giảm độ thanh thải cefuroxim ở thận, làm cho nồng độ cefuroxim trong huyết tương cao hơn và kéo dài hơn.
- Tăng độc tính: aminoglycosid làm tăng khả năng gây nhiễm độc thận.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng, thuộc nhóm cephalosporin. Cefuroxim axetil là tiền chất của cefuroxim, chất này có rất ít hoạt tính kháng khuẩn khi chưa bị thủy phân thành cefuroxim trong cơ thể sau khi được hấp thu.
- Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào các protein đích thiết yếu (các protein gắn penicillin). Nguyên nhân kháng thuốc có thể là do vi khuẩn tiết enzym cephalosporinase, hoặc do biến đổi các protein gắn penicillin.
- Cefuroxim có hoạt tính hữu hiệu và rất đặc trưng chống nhiều tác nhân gây bệnh thông thường, kể cả chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Cefuroxim đặc biệt rất bền với nhiều enzym beta – lactamase của vi khuẩn Gram âm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Sau khi uống cefuroxim được hấp thu qua đường tiêu hóa và nhanh chóng bị thủy phân ở niêm mạc ruột và trong máu để phóng thích cefuroxim vào hệ tuần hoàn. Thuốc được hấp thu tốt nhất khi uống trong bữa ăn.
- Có tới 50% cefuroxim trong hệ tuần hoàn liên kết với protein huyết tương. Nửa đời của thuốc trong huyết tương khoảng 70 phút và dài hơn ở người suy thận và ở trẻ sơ sinh.
- Cefuroxim phân bố rộng khắp cơ thể, kể cả dịch màng phổi, đờm, xương, hoạt dịch và thủy dịch. Thể tích phân bố biểu kiến ở người lớn khỏe mạnh nằm trong khoảng từ 9,3 – 15,8 lit/1,73 m². Cefuroxim đi qua hàng rào máu não khi màng – não bị viêm. Thuốc qua nhau thai và có bài tiết qua sữa mẹ.

- Cefuroxim không bị chuyển hóa và được thải trừ ở dạng không biến đổi, khoảng 50% qua lọc cầu thận và khoảng 50% bài tiết ở ống thận. Thuốc đạt nồng độ cao trong nước tiểu.
- Probenecid ức chế thải trừ cefuroxim qua ống thận làm cho nồng độ cefuroxim trong huyết tương tăng cao và kéo dài hơn. Cefuroxim chỉ thải trừ qua mật với lượng rất nhỏ.
- Nồng độ cefuroxim trong huyết thanh bị giảm khi thẩm tách.

QUÁ LIỀU XỬ TRÍ:**Quá liều cấp:**

- Phản ứng quá liều thường gặp là buồn nôn, nôn, và tiêu chảy. Tuy nhiên, có thể gây phản ứng tăng kích thích thần kinh cơ và cơ co giật, nhất là ở người suy thận.

Xử trí quá liều:

- Cần quan tâm đến khả năng quá liều của nhiều loại thuốc, sự tương tác thuốc và được động học bất thường ở người bệnh.
- Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng khí và truyền dịch. Nếu phát triển các cơn co giật, ngưng ngay sử dụng thuốc, có thể sử dụng liệu pháp chống co giật nếu có chỉ định về lâm sàng. Thẩm tách máu có thể loại bỏ thuốc khỏi máu, nhưng phần lớn việc điều trị là hỗ trợ hoặc giải quyết triệu chứng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 gói x 3 gam.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCSS

CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

Không sử dụng thuốc nếu:

- * *Bặt thuốc bị biến màu, chảy nước.*
- * *Gói thuốc bị rách, thủng.*

- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ VIDIPHA
184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446
Sản xuất tại chi nhánh
CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương