

Rx
THUỐC BÁN THEO ĐƠN

VIFLOXACOL

THUỐC NHỎ MẮT, TAI

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 5ml chứa:

- + **Hoạt chất chính:** Ofloxacin.....15mg
- + **Tá dược :** Natri clorid, acid hydrochloric 1N, natri hydroxyd 1N, benzalkonium clorid, nước cất vđ 5ml.

CHỈ ĐỊNH:

- Các nhiễm trùng ở phần ngoài mắt (viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc những bộ phận phụ (viêm mi mắt, viêm túi lệ) do những chủng vi khuẩn nhạy cảm với ofloxacin.
- Viêm tai ngoài, viêm tai giữa cấp, viêm tai giữa mạn có nhiều mủ do nhiều loại vi khuẩn khác nhau.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với ofloxacin hay bất kỳ dẫn xuất nào của quinolon.
- Trẻ em dưới 16 tuổi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- **Nhỏ mắt:** liều lượng phụ thuộc vào mức độ nhiễm trùng và được bác sĩ chuyên khoa mắt quyết định. Thông thường mỗi lần nhỏ 1 giọt, 3 lần/ngày.

- **Nhỏ tai:** mỗi lần 2 - 3 giọt, 3 lần/ngày.

Lưu ý khi sử dụng:

- Đậy chặt nắp sau khi dùng.
- Không chạm đầu nút trong của chai thuốc trực tiếp vào mắt, tai để tránh nhiễm bẩn thuốc.
- Chai thuốc sau khi mở chỉ nên dùng trong vòng 15 ngày.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể gây kích ứng tạm thời.
- Có thể gây phản ứng quá mẫn.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Không được tiêm thuốc vào xung quanh hoặc trong mắt.
- Tránh dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Trường hợp trị liệu cùng một thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất khác, phải dùng cách nhau khoảng 15 phút.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Ofloxacin là thuốc kháng khuẩn nhóm fluoroquinolon giống như ciprofloxacin. Ofloxacin có phổ kháng khuẩn rộng bao gồm *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria spp.*, *Staphylococcus*, *Streptococcus pneumoniae* và một vài vi khuẩn gram dương khác.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Ofloxacin được phân bố rộng khắp vào các dịch cơ thể, kể cả dịch não tủy và xâm nhập tốt vào các mô.
- Ofloxacin được hấp thu qua giác mạc vào dịch thủy tinh thể sau khi nhỏ thuốc vào mắt; sự hấp thu tăng lên khi mắt bị viêm và/hoặc có tổn thương biểu mô.

- Khi nhỏ thuốc vào tai ofloxacin có độ xuyên thấm tốt, được tìm thấy trong niêm mạc tai giữa, trong dịch tai và có thể hấp thu vào máu.

QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ: Chưa có tài liệu.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 5 ml. Hộp 1 chai.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (chưa mở chai thuốc).

TIÊU CHUẨN: TCCS.

CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

Không sử dụng thuốc nếu:

* *Dung dịch thuốc bị biến màu, không trong suốt.*

* *Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.*

- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng không mong muốn.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.U VIDIPHA

184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446

Sản xuất tại chi nhánh

CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương