

Rx

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

## NEFOPAM

DUNG DỊCH TIÊM

**THÀNH PHẦN:** Mỗi ống 2ml chứa:

+ **Hoạt chất chính:** Nefopam hydroclorid.....20mg.

+ **Tá dược:** Dinatri hydrophosphat, natri dihydrophosphat, nước cất pha tiêm.

**CHỈ ĐỊNH:**

– Giảm đau trong các cơn đau cấp tính và mạn tính: đau do nguồn gốc thần kinh, đau đầu, đau cơ và các chứng co thắt,...

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

– Trẻ em dưới 15 tuổi.  
– Bệnh nhân có tiền sử rối loạn co giật.

**LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:**

– **Tiêm bắp thịt:** Nefopam cần được tiêm bắp thịt sâu 1 ống (20mg), liều này có thể lặp lại sau mỗi 6 giờ, nhưng không quá 6 ống/ngày.

– **Tiêm tĩnh mạch:** Nefopam cần được tiêm tĩnh mạch chậm trong thời gian dưới 5 phút, người bệnh phải được tiêm thuốc ở tư thế nằm nhằm tránh tác dụng phụ đột ngột như chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi nhiều. Liều thông thường: 1 ống/lần, lặp lại sau mỗi 4 giờ nếu cần, nhưng không quá 6 ống/ngày.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

– **Thường gặp:** rối loạn tiêu hóa bao gồm buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi, ngứa gà, mất ngủ, ứ nước tiểu, chóng mặt, hạ huyết áp, run, dị cảm, đánh trống ngực, choáng, căng thẳng, bồn chồn, nhìn mờ, nhức đầu, khô miệng, ngất, phù mạch và tim đập nhanh.

– **Hiếm gặp:** ảo giác, co giật, nước tiểu tạm thời đổi màu hồng.

**Ghi chú:** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**THẬN TRỌNG:**

– Sử dụng thận trọng ở người già và người bệnh bị glaucoma, ứ nước tiểu, suy chức năng gan, thận, bệnh tim mạch.

– **Phụ nữ mang thai và cho con bú:** Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

– **Lái xe và vận hành máy móc:** không sử dụng.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

– Không dùng nefopam cho những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế MAO.

– Sử dụng thận trọng cho những người đang dùng thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

**DƯỢC LỰC HỌC:**

– Nefopam là thuốc giảm đau không thuộc họ morphin. Nefopam có cấu trúc hóa học không liên quan đến những chất giảm đau đã biết khác.

– Mặc dù cơ chế tác động chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, nhưng thực nghiệm cho thấy tác động vượt trội trên thần kinh trung ương do ức chế dopamin, noradrenalin và serotonin ở mức độ synap.

– Nefopam không có tác động ức chế naloxon qua các thụ thể của opioid. Nefopam không gây quen thuốc cũng như lệ thuộc thuốc và hiện tượng cai nghiện thuốc.

– Khi sử dụng lâu dài, tác động giảm đau không bị suy giảm. Nefopam không có tác động kháng viêm cũng như hạ sốt, không gây suy hô hấp và làm chậm sự chuyển hóa ở ruột.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

– Sau khi tiêm bắp liều 20mg, pic huyết tương xuất hiện khoảng 0,5 - 1 giờ, nồng độ tối đa khoảng 25ng/ml. Nửa đời huyết tương khoảng 5 giờ.

– Trong khi tiêm tĩnh mạch với liều tương tự, nửa đời huyết tương khoảng 4 giờ.

– Liên kết với protein huyết tương khoảng 71 - 76%. Chuyển hóa sinh học rất quan trọng và 3 chất chuyển hóa tương tự là demetyl - nefopam, N - oxyd - nefopam, N - glucuronid - nefopam, trong đó 2 chất chuyển hóa đầu tiêu thì không liên hợp và không còn hoạt tính giảm đau khi thử nghiệm trên súc vật.

– Nefopam được thải trừ chủ yếu trong nước tiểu: 87% liều dùng được tìm thấy trong nước tiểu. Ít hơn 5% liều dùng được bài tiết dưới dạng không đổi.

**QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:**

– **Triệu chứng:** biểu lộ kiểu kháng tiết cholin như tim đập nhanh, co giật và ảo giác.

– **Điều trị:** trị các triệu chứng với sự theo dõi nhịp tim và hô hấp, vào bệnh viện.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI :** Hộp 10 ống 2ml.

**BẢO QUẢN :** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG :** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN :** TCCS

**CHÚ Ý :** THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

**Không sử dụng thuốc này nếu:**

\* **Dung dịch thuốc bị biến màu, không trong suốt.**

\* **Ống thuốc bị nứt, vỡ.**

– Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.

– Để xa tầm tay trẻ em.

– Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

– Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



VIDIPHA

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA**

184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (84-28)-38440106

Fax: (84-28)-38440446

**Sản xuất tại chi nhánh**

**CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG**

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương