

# CINNARIZIN 25mg

## VIÊN NÉN

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén chứa:

- ◆ **Hoạt chất chính:** Cinnarizin.....25mg
- ◆ **Tá dược:** Tinh bột ngô, lactose, avicel 101, P.V.P K30, bột talc, magnesi stearat, aerosil.

### CHỈ ĐỊNH:

- ◆ Phòng say tàu xe.
- ◆ Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- ◆ Mẫn cảm với cinnarizin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- ◆ Loạn chuyển hóa porphyrin.

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

**Cách dùng:** Dùng đường uống, nên uống sau bữa ăn.

#### Liều uống:

- ◆ Phòng say tàu xe:
  - Người lớn: Mỗi lần 1 viên nửa giờ trước khi khởi hành, lặp lại mỗi 6 giờ.
  - Trẻ em 5 – 12 tuổi: Nửa liều người lớn.
- ◆ Rối loạn tiền đình:
  - Người lớn: Mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.
  - Trẻ em 5 – 12 tuổi: Nửa liều người lớn.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):

#### *Thường gặp, ADR > 1/100*

- ◆ Thần kinh trung ương: Ngủ gà.
- ◆ Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa.
  - Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100**
  - ◆ Thần kinh trung ương: Nhức đầu.
  - ◆ Tiêu hóa: Khô miệng, tăng cân.
- ◆ Khác: Ra mồ hôi, phản ứng dị ứng.

#### *Hiếm gặp, ADR < 1/1000*

- ◆ Thần kinh trung ương: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuổi hoặc khi điều trị dài ngày.
- ◆ Tim mạch: Giảm huyết áp (liều cao).

**Ghi chú:** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### THẬN TRỌNG:

- ◆ Cinnarizin có khả năng gây đau vùng thượng vị. Uống thuốc sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày.

- ◆ Cinnarizin có thể gây ngủ gà, đặc biệt lúc khởi đầu điều trị. Phải tránh những công việc cần sự tỉnh táo (ví dụ: lái xe).
- ◆ Phải tránh dùng cinnarizin dài ngày ở người cao tuổi, vì có thể gây tăng hoặc xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giác trầm cảm trong điều trị kéo dài.

**PHỤ NỮ MANG THAI:** Chỉ dùng cinnarizin khi thật sự cần thiết.

**PHỤ NỮ CHO CON BÚ:** Chỉ dùng cinnarizin khi lợi ích điều trị cho người mẹ trội hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ.

**NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Vì buồn ngủ có thể xảy ra, đặc biệt lúc bắt đầu điều trị, nên thận trọng trong các hoạt động như lái xe, vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Rượu (chất ức chế thần kinh trung ương), thuốc chống trầm cảm ba vòng: Sử dụng đồng thời với cinnarizin có thể làm tăng tác dụng an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của cinnarizin.

### QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:

- ◆ **Triệu chứng:** Nôn, buồn ngủ, hôn mê, run, giảm trương lực.
- ◆ **Xử trí:** Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Đến nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

### QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ◆ Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
- ◆ Hộp 1 chai x 100 viên nén.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

### TIÊU CHUẨN: ĐVN V

**CHÚ Ý:** Không sử dụng thuốc nếu:

- ◆ **Viên thuốc bị biến màu, móp méo, nứt vỡ.**
- ◆ **Vỉ thuốc bị rách.**
- ◆ **Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.**
- ◆ **Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.**
- ◆ **Để xa tầm tay trẻ em.**
- ◆ **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**
- ◆ **Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.**
- ◆ **Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.**



VIDIPHA

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA**  
184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM  
ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446  
*Sản xuất tại chi nhánh*  
**CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG**  
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương