

PROMETHAZIN 2%

KEM BÔI DA

THÀNH PHẦN: Mỗi tuýp 10g chứa:

+ **Hoạt chất chính:** Promethazin hydrochlorid.....0,2g
+ **Tá dược:** Nipagin, natri sulfit, propylene glycol, polawax, cetyl alcohol, glycerin, nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH:

Các bệnh da do dị ứng: mề đay, ngứa, phát ban ở da do có nguồn gốc dị ứng, vết đốt của côn trùng, phỏng nhẹ bê mặt.

CHỐNG CHI ĐỊNH:

Các bệnh da có nhiễm trùng hay dễ kích ứng, eczema, các tổn thương có rỉ nước.

LƯỢNG & CÁCH DÙNG: THEO SỰ CHỈ ĐẪN CỦA THÁY THUỐC

Thoa thuốc 3 - 4 lần/ ngày.

Chú ý: - Dùng dầu nhọn ở nắp ngoài để mở dầu tuýp

- Vẫn chất nắp sau khi dùng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Hiếm khi gây mẩn cảm ở da hay mẩn cảm với ánh sáng.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẨM TRỌNG:

- Ngứa chỉ là một triệu chứng. Trong mọi trường hợp cần tìm cho ra nguyên nhân để điều trị.

- Không được dùng các thuốc kháng histamin cho trẻ em non hoặc sơ sinh vì nhóm này thường rất dễ nhạy cảm với tác dụng ức chế hô hấp và kháng cholinergic ở thần kinh trung ương của thuốc.

- Các thuốc này cũng tránh dùng cho trẻ em có dấu hiệu và biểu hiện của hội chứng Reye, đặc biệt là khi dùng liều cao vì có thể gây ra các triệu chứng ngoại tháp dễ lẫn với các dấu hiệu thần kinh trung ương của hội chứng này, do đó gây khó khăn cho chẩn đoán.

- **Phụ nữ mang thai:** Chỉ nên dùng promethazin cho người có thai khi mà lợi ích điều trị xác đáng hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

- **Phụ nữ nuôi con bú:** Do không biết thuốc có phân bố vào sữa mẹ hay không, nên thận trọng khi dùng cho người đang cho con bú. Các thuốc kháng histamin có thể ức chế tiết sữa do tác dụng kháng cholinergic.

TƯƠNG TÁC THUỐC: (chưa có tài liệu)

QUẢ LIỆU, XỬ TRÍ: Bảo ngay cho bác sĩ khi dùng quá liều chỉ định.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 10g - Hộp 1 tuýp

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Nút kín, tránh va chạm mạnh.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (chưa mở thuốc).

TIÊU CHUẨN: TCSS

CHÚ Ý: Không sử dụng thuốc nếu:

* Thuốc bị biến màu, biến dạng.

* Tuýp bị nứt, thủng hay ráo rỉ.

- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.

- Để xa tầm tay trẻ em.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.U VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446

Sản xuất tại chi nhánh

CÔNG TY CPDP T.U VIDIPHA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương