

RHYNIXSOL

THUỐC NHỖ MŨI

THÀNH PHẦN: Mỗi chai 5ml, 10ml, 15ml chứa:

- ♦ **Hoạt chất chính:** Naphazolin nitrat.....2,5 mg (chai 5ml)
Naphazolin nitrat.....5 mg (chai 10ml)
Naphazolin nitrat.....7,5 mg (chai 15ml)
- ♦ **Tá dược:** Natri clorid, methylparaben, propylparaben, nước cất vừa đủ 1 chai.

CHỈ ĐỊNH:

- ♦ Giảm triệu chứng và giảm sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm lạnh, cảm mạo hoặc dị ứng.
- ♦ Giảm sưng để dễ quan sát niêm mạc mũi và họng trước khi phẫu thuật hoặc thủ thuật chẩn đoán, làm thông lỗ vòi nhĩ bị tắc ở bệnh nhân viêm tai.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- ♦ Mẫn cảm với thuốc.
- ♦ Trẻ em dưới 6 tuổi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- ♦ Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Sung huyết mũi (ngạt mũi): nhỏ 1 - 2 giọt, 3 - 6 giờ một lần nếu cần. Thời gian dùng không nên quá 3 - 5 ngày.
- ♦ Liều cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được xác định.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- ♦ **Thường gặp:** Kích ứng tại chỗ.
- ♦ **Ít gặp:** Cảm giác bỏng, rát, khô hoặc loét niêm mạc, hắt hơi; sung huyết trở lại với biểu hiện như đỏ, sưng và viêm mũi khi dùng thường xuyên, lâu ngày.
- ♦ **Hiếm gặp:** Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đánh trống ngực, mạch chậm và loạn nhịp.

Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- ♦ Dùng cho trẻ từ 6 - 12 tuổi khi có chỉ dẫn và giám sát của thầy thuốc.
- ♦ Thận trọng khi dùng thuốc cho những người bệnh cường giáp, bệnh tim, tăng huyết áp, hoặc đái tháo đường, người đang dùng các chất ức chế monoamin oxidase, tuy vậy với liều đã được khuyến cáo, thông thường không hạn chế dùng.
- ♦ Không nên dùng nhiều lần và liên tục để tránh bị sung huyết nặng trở lại. Khi dùng thuốc nhỏ mũi liên tục 3 ngày không thấy đỡ, bệnh nhân cần ngừng thuốc và đi khám bác sỹ.

PHỤ NỮ MANG THAI:

- ♦ Chưa rõ ảnh hưởng của naphazolin trên bào thai.
- ♦ Chỉ nên dùng thuốc này khi thật cần thiết.

PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

- ♦ Chưa rõ naphazolin có tiết vào sữa mẹ không.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- ♦ Nên cẩn thận vì thuốc có thể gây chóng mặt.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ♦ Sử dụng naphazolin cho bệnh nhân đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxidase, maprotilin hoặc các thuốc chống trầm cảm 3 vòng có thể gây phản ứng tăng huyết áp nặng.

QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:

- ♦ **Quá liều:** Ngộ độc do quá liều (khi dùng tại chỗ liều quá cao hoặc uống nhầm) có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương như hạ nhiệt, tim đập chậm, ra mồ hôi, buồn ngủ, hôn mê đặc biệt ở trẻ em.
- ♦ **Xử trí:** Chủ yếu bằng điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ♦ Chai 15 ml. Hộp 1 chai.
- ♦ Chai 5 ml. Hộp 1 chai, hộp 10 chai.
- ♦ Chai 10ml. Hộp 1 chai, hộp 10 chai.

BẢO QUẢN:

- ♦ Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

- ♦ 24 tháng kể từ ngày sản xuất (chưa mở chai thuốc).
- ♦ Không quá 15 ngày sau khi mở nắp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: Không sử dụng thuốc nếu:

- ♦ *Dung dịch thuốc bị biến màu, không trong suốt.*
- ♦ *Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.*
- ♦ *Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.*
- ♦ *Để xa tầm tay trẻ em.*
- ♦ *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.*
- ♦ *Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.*



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.U VIDIPHA
184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446
Sản xuất tại chi nhánh
CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương