

# SORBITOL Thuốc bột

5g

**THÀNH PHẦN:** Mỗi gói 5g chứa:

\* **Hoạt chất chính:** Sorbitol.....5g.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng táo bón và khó tiêu.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Trong các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Trường hợp tắc đường dẫn mật.
- Người bệnh không dung nạp fructose do di truyền (bệnh chuyển hóa hiếm gặp).

**LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:**

- Chỉ được dùng các thuốc nhuận tràng thẩm thấu với liều đơn và không thường xuyên.
- Điều trị triệu chứng khó tiêu: uống thuốc trước bữa ăn hoặc khi bị khó tiêu, người lớn 1 - 3 gói mỗi ngày.
- Điều trị táo bón: người lớn uống 1 gói vào lúc đói, buổi sáng; trẻ em uống ½ liều người lớn.

**Ghi chú:** Pha 1 gói trong ½ cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Có thể bị tiêu chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có "đại tràng kích thích" hoặc trường bụng.

**Ghi chú:** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**THẬN TRỌNG:**

- Ở người bệnh "đại tràng kích thích" tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.
- Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

**PHỤ NỮ MANG THAI:** (chưa có tài liệu).

**PHỤ NỮ CHO CON BÚ:** (chưa có tài liệu).

**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** (chưa có tài liệu).

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

**QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:** Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 25 gói x 5g thuốc bột.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS

**CHÚ Ý:** Không sử dụng thuốc nếu: \* **Bột thuốc bị biến màu, chảy nước.**

\* **Gói thuốc bị rách, thủng.**

- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



VIDIPHA

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA**

184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (84-28)-38440106

Fax: (84-28)-38440446

**Sản xuất tại chi nhánh**

**CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG**

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương