

ACETYLCYSTEIN 200mg

THUỐC BỘT

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 1g chứa:

- **Hoạt chất chính:** Acetylcystein.....200mg
- **Tá dược:** Lactose, aspartam, bột hương vị trái cây, aerosil, màu vàng tartrazin.

CHỈ ĐỊNH: Dùng làm thuốc long đờm, tiêu nhầy trong các bệnh lý hô hấp có đờm đặc quánh hoặc tăng tiết nhầy như viêm phế quản cấp và mạn, viêm mũi, viêm xoang.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Tiền sử hen.
- Quá mẫn với acetylcystein.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA THẦY THUỐC

- Cách dùng: hòa tan thuốc trong ½ ly nước trước khi dùng.
- Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 1 gói/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 2 -7 tuổi: 1 gói/lần x 2 lần/ngày.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gặp có thể gặp rối loạn trong lâm sàng do acetylcystein, nhưng vẫn có thể xảy ra với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein.
- Thường gặp: buồn nôn, nôn.
- Ít gặp: buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mề đay.
- Hiếm gặp: có thể gặp phản ứng dị ứng dạng phản vệ toàn thân; Sốt, rét run.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có cơ chế phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol (thuốc chứa beta - 2 adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn) hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay.
- Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đàm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.
- Bệnh nhân loét dạ dày - tá tràng.

PHỤ NỮ CÓ THAI: Cho tới nay, chưa có ghi nhận về ảnh hưởng nào đáng kể khi dùng acetylcystein cho phụ nữ có thai, chỉ nên sử dụng thuốc khi thật cần thiết.

PHỤ NỮ CHO CON BÚ: Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thận trọng khi dùng thuốc vì thuốc có thể gây buồn ngủ, nhức đầu, ù tai...

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy hóa.
- Không được dùng đồng thời với các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

QUÁ LIỀU - XỬ TRÍ:

- Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận.
- Điều trị quá liều theo triệu chứng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 20 gói x 1g.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: *Không sử dụng thuốc nếu*

- Bột thuốc bị biến màu, chảy nước.
- Gói thuốc bị rách, thủng, tróc nhãn.
- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho Bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA
184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446
Sân xuất tại chi nhánh
CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương