

BIXOVOM 4

VIÊN NÉN BAO PHIM

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa:

- ♦ **Hoạt chất chính:** Bromhexin hydroclorid.....4 mg.
- ♦ **Tá dược:** Tinh bột ngô, lactose, P.V.P K30, bột talc, magnesi stearat, aerosil, H.P.M.C, titan dioxyd, phẩm màu Indigotin, dầu thầu dầu.

CHỈ ĐỊNH:

- ♦ Trong các bệnh rối loạn dịch phế quản: Nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- ♦ Mẫn cảm với bromhexin và các thành phần của thuốc.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Cách dùng: Dùng đường uống.

Liều dùng:

- ♦ Thời gian điều trị không được kéo dài quá 8 – 10 ngày nếu chưa có ý kiến của thầy thuốc.
- ♦ Trung bình:
 - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 8mg (2 viên)/ lần, 3 lần/ ngày.
 - Trẻ em 6 – 12 tuổi: 4mg (1 viên)/ lần, 3 lần/ ngày.
 - Trẻ em 2 – 6 tuổi: 4mg (1 viên)/ lần, 2 lần/ ngày.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Ít gặp:

- ♦ Tiêu hóa: Đau dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
- ♦ Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.
- ♦ Da: Ban da, mề đay.
- ♦ Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

Hiếm gặp:

- ♦ Tiêu hóa: Khô miệng.
- ♦ Gan: Tăng enzym transaminase AST, ALT.

Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- ♦ Tránh phối hợp với thuốc giảm ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.
- ♦ Khi dùng cho người có tiền sử loét dạ dày (do tác dụng làm tiêu dịch nhày, nên có thể gây huỷ hoại hàng rào niêm mạc dạ dày).
- ♦ Người bệnh hen (do thuốc có thể gây co thắt phế quản ở người mẫn cảm).
- ♦ Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyển hoá có thể bị giảm ở bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.
- ♦ Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược, quá yếu không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ứ đờm.

- ♦ Không nên dùng BIXOVOM 4 cho trẻ em dưới 2 tuổi.

PHỤ NỮ MANG THAI:

- ♦ Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quái thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm. Trên người, cũng chưa có đủ tài liệu nghiên cứu: vì vậy không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

- ♦ Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mẹ đang cho con bú.

NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- ♦ Thận trọng khi sử dụng vì thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ♦ Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiểu atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.
- ♦ Không phối hợp với các thuốc chống ho.

QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:

- ♦ Cho đến nay chưa có báo cáo về quá liều do bromhexin. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
- ♦ Báo ngay cho bác sỹ khi dùng quá liều chỉ định.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ♦ Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim.
- ♦ Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.
- ♦ Hộp 1 chai x 100 viên bao phim.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: Không sử dụng thuốc nếu:

- ♦ Viên thuốc bị biến màu, nứt vỡ.
 - ♦ Vỉ thuốc bị rách.
 - ♦ Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.
 - ♦ Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng
 - ♦ Để xa tầm tay trẻ em.
 - ♦ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**
- ♦ Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA

184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (84-28)-38440106

Fax: (84-28)-38440446

Sản xuất tại chi nhánh

CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương