

# BIXOVOM 8

## VIÊN NÉN BAO PHIM

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

- ◆ **Hoạt chất chính:** Bromhexin hydrochlorid.....8 mg.
- ◆ **Tá dược:** Tinh bột ngô, lactose, P.V.P K30, bột talc, magnesi stearat, aerosil, H.P.M.C, titan dioxyd, phẩm màu violet, dầu thầu dầu.

### CHỈ ĐỊNH:

Trong các bệnh rối loạn dịch phế quản: Nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bromhexin và các thành phần của thuốc.

### LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

**Cách dùng:** Dùng đường uống.

#### Liều dùng:

- ◆ Thời gian điều trị không được kéo dài quá 8 – 10 ngày nếu chưa có ý kiến của thầy thuốc.
- ◆ Trung bình:
  - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 8mg (1 viên)/ lần, 3 lần/ ngày.
  - Trẻ em 6 – 12 tuổi: 4mg (½ viên)/ lần, 3 lần/ ngày.
  - Trẻ nhỏ 2 – 6 tuổi: 4mg (½ viên)/ lần, 2 lần/ ngày.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

#### Ít gặp:

- ◆ Tiêu hóa: Đau dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
- ◆ Thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, ra mồ hôi.
- ◆ Da: Ban da, mày đay.
- ◆ Hô hấp: Nguy cơ ứ dịch phế quản ở người bệnh không có khả năng khạc đờm.

#### Hiếm gặp:

- ◆ Tiêu hóa: Khô miệng.
- ◆ Gan: Tăng enzym transaminase AST, ALT.

**Ghi chú:** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### THẬN TRỌNG:

- ◆ Tránh phối hợp với thuốc giảm ho vì có nguy cơ ứ đọng đờm ở đường hô hấp.
- ◆ Khi dùng cho người có tiền sử loét dạ dày (do tác dụng làm tiêu dịch nhầy, nên có thể gây huỷ hoại hàng rào niêm mạc dạ dày).
- ◆ Người bệnh hen (do thuốc có thể gây co thắt phế quản ở người mẫn cảm).
- ◆ Sự thanh thải bromhexin và các chất chuyển hoá có thể bị giảm ở bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng, nên cần phải thận trọng và theo dõi.
- ◆ Cần thận trọng khi dùng bromhexin cho người cao tuổi hoặc suy nhược, quá yếu không có khả năng khạc đờm có hiệu quả do đó càng tăng ú đờm.
- ◆ Không nên dùng BIXOVOM 8 cho trẻ em dưới 2 tuổi.

### PHỤ NỮ MANG THAI:

- ◆ Chưa nghiên cứu tác dụng sinh quai thai của bromhexin ở động vật thí nghiệm.
- ◆ Trên người, cũng chưa có đủ tài liệu nghiên cứu: vì vậy không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mang thai.

### PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

- ◆ Còn chưa biết bromhexin có bài tiết vào sữa mẹ không. Vì vậy, không khuyến cáo dùng bromhexin cho người mẹ đang cho con bú.

### NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thận trọng khi sử dụng vì thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt.

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ◆ Không phối hợp với thuốc làm giảm tiết dịch (giảm cả dịch tiết khí phế quản) như các thuốc kiềm atropin (hoặc anticholinergic) vì làm giảm tác dụng của bromhexin.
- ◆ Không phối hợp với các thuốc chống ho.

### QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ:

- ◆ Cho đến nay chưa có báo cáo về quá liều do bromhexin. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
- ◆ Báo ngay cho bác sĩ khi dùng quá liều chỉ định.

### QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ◆ Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim.
- ◆ Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.
- ◆ Hộp 1 chai x 100 viên bao phim.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

### TIÊU CHUẨN: TCCS

### CHÚ Ý:

#### Không sử dụng thuốc nếu:

- ◆ Viên thuốc bị biến màu, nứt vỡ.
- ◆ Vỉ thuốc bị rách.
- ◆ Chai thuốc bị nứt, mất nhãn.
- ◆ Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- ◆ Để xa tầm tay trẻ em.
- ◆ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- ◆ Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯ VIDIPHA

184/2, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (84-28)-38440106 Fax: (84-28)-38440446

Sản xuất tại chi nhánh

### CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

